

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT**a) DENOMINATION****CATACOL® 0,1 %, collyre**
Inosine monophosphate**b) COMPOSITION**

Inosine phosphate disodique dihydraté	0,100 g
Gluconate de chlorhexidine	0,005 g
Chlorure de sodium, eau purifiée	q.s.p. 100 ml

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Collyre - Flacon compte-gouttes de 10 ml

d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUEAUTRES MEDICAMENTS OPHTHALMOLOGIQUES
(S : Organes sensoriels)**e) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE / EXPLOITANT**Laboratoires ALCON
4, Rue Henri Sainte-Claire Deville
F-92563 RUEIL-MALMAISON CEDEX**NOM ET ADRESSE DU FABRICANT**ALCON CUSÍ, S.A.
E-08320 El Masnou, Barcelone**2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT****(INDICATIONS THERAPEUTIQUES)**

Ce médicament est indiqué en traitement d'appoint des opacifications du cristallin.

3. ATTENTION !**a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans la situation suivante:

- Antécédents d'allergie à l'un des constituants du collyre.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.***b) MISES EN GARDE SPECIALES**

Ne pas injecter, ne pas avaler.

c) PRECAUTIONS D'EMPLOIEn cas d'aggravation des symptômes : *CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.*

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, espacer de 15 minutes les instillations.

*EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.***d) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

L'efficacité d'un collyre peut être affectée par l'instillation simultanée d'un autre collyre (cf. précautions d'emploi).

*AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.***e) GROSSESSE - ALLAITEMENT**

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT**a) POSOLOGIE**


1 goutte de collyre 2 à 4 fois par jour, 1 fois le matin, 1 fois le soir.

b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATIONVoie locale
EN INSTILLATION OCULAIRE.
Ne pas avaler, ne pas injecter.Se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.
Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout compte-gouttes.
Instiller la solution dans l'œil en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas. L'œil fermé, essuyer proprement l'excédent.

Refermer le flacon après utilisation.

Pour faciliter l'utilisation de votre collyre, un schéma sur l'étui vous permet de noter :

- la date d'ouverture,
- la date limite d'utilisation (ouverture + 15 jours)
- les prises du collyre (cochez les cases au fur et à mesure)



c) DUREE DU TRAITEMENT

Se conformer à l'avis de votre médecin.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

(EFFETS INDESIRABLES)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS ;

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

6. CONSERVATION

a) NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR


b) PRECAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25°C.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Tout flacon entamé doit être utilisé dans les 15 jours.

Notez sur l'étiquette du flacon la date limite d'utilisation (= date d'ouverture + 15 jours) après la mention "A utiliser jusqu'au (jour, mois)".



7. DATE DE REVISION DE LA NOTICE

FEVRIER 2009.

MEDICAMENT AUTORISE N° 313 059.4



"Les Laboratoires ALCON participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament, vide ou non".

Alcon[®]