

CORRECTOL 0,1 POUR CENT

Collyre

Composition : Inosine phosphate disodique dihydraté (0,100 g pour 100 ml). Excipients : Gluconate de chlorhexidine, chlorure de sodium, eau purifiée. **Indications thérapeutiques :** Traitement d'appoint des troubles de la vision binoculaire en complément de la rééducation. **Posologie et mode d'administration :** Voie locale. En instillation oculaire. 2 instillations quotidiennes pendant 15 jours, puis un jour sur deux. Le traitement peut être prolongé sans inconvénient. Se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation. Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout compte-gouttes. Instiller la solution dans l'œil en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas. L'œil fermé, essuyer proprement l'excédent. Refermer le flacon après utilisation. **Contre-indications :** Ce médicament est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité à l'un des constituants du collyre. **Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :** Ne pas injecter, ne pas avaler. Le collyre ne doit pas être administré en injection péri- ou intraoculaire. En cas de traitement concomitant par un autre collyre, espacer de 15 minutes les instillations. **Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions :** L'efficacité d'un collyre peut être affectée par l'instillation simultanée d'un autre collyre (cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). **Grossesse et allaitement :** A utiliser avec prudence chez la femme enceinte ou qui allaite, faute de données cliniques exploitables. **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines :** Une gêne visuelle passagère peut être ressentie après instillation du collyre en solution. Dans ce cas, il est conseillé de ne pas conduire ou d'utiliser de machines jusqu'au retour de la vision normale. **Effets indésirables :** Les effets indésirables suivants ont été rapportés. Les fréquences ne peuvent être estimées sur la base des données disponibles. Les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. **Affections oculaires :** Gêne oculaire, irritation oculaire. **Surdosage :** Une utilisation excessive du collyre pourra aggraver les effets indésirables. En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique stérile. **Propriétés pharmacodynamiques :** Classe pharmacothérapeutique : Autres médicaments ophtalmologiques (S : Organes sensoriels). Action sur l'accommodation et la convergence, sans modification du diamètre pupillaire. **Données de sécurité préclinique :** Il n'existe pas de données précliniques sur la mutagénicité, la cancérogénicité ou la tératogénicité de l'utilisation topique de ce produit. **Durée de conservation :** Avant ouverture : 3 ans. Après ouverture : 15 jours. **Précautions particulières de conservation :** A conserver à une température inférieure à 25°C. **NUMERO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ :** CIP N° 3400931946311. Flacon compte-gouttes de 10 ml en PEBD, bouchon en PP. Non remboursé Séc. Soc. **CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE :** Médicament non soumis à prescription médicale. **TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ :** Laboratoires ALCON - 4, rue Henri Sainte-Claire Deville – F-92563 RUEIL-MALMAISON CEDEX. **Date de mise à jour du texte :** Juin 2011.