

ISOPTO-PILOCARPINE
Collyres 0,5 % - 1 % - 2 %

DENOMINATION : ISOPTO-PILOCARPINE, collyre 0,5 %. ISOPTO-PILOCARPINE, collyre 1 %. ISOPTO-PILOCARPINE, collyre 2 %.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : *Isopto-Pilocarpine 0,5 %* : Chlorhydrate de Pilocarpine (0,50 g), excipients (q.s.p. 100 ml). *Isopto-Pilocarpine 1 %* : Chlorhydrate de Pilocarpine (1,00 g), excipients (q.s.p. 100 ml). *Isopto-Pilocarpine 2 %* : Chlorhydrate de Pilocarpine (2,00 g), excipients (q.s.p. 100 ml).

FORME PHARMACEUTIQUE : Collyres.

DONNEES CLINIQUES : **Indications thérapeutiques** : Glaucome chronique simple. Crise aiguë du glaucome (par fermeture d'angle). Diagnostic des causes de mydriase.

Posologie et mode d'administration : Instillations oculaires selon chiffres tensionnels et type de glaucome. Une seule goutte suffit à chaque instillation.

Contre-indications : Iridocyclites. Allergies à la pilocarpine.

Mises en garde et précautions particulières d'emploi : **Mises en garde** : Des instillations répétées et/ou de façon prolongée peuvent entraîner un passage systémique non négligeable du produit actif. A n'utiliser chez les myopes qu'après avoir vérifié l'état de la périphérie rétinienne (peut entraîner un décollement de la rétine).

Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions : En cas d'intervention chirurgicale, prévenir l'anesthésiste et l'opérateur (possibilité de potentialisation des curarisants).

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines : Gêne possible due au myosis.

Effets indésirables : Modification possible du champ visuel. Myosis qui peut gêner la vision des malades. Spasme de l'accommodation qui apparaît rapidement après l'instillation et qui disparaît environ 2 heures après. Quelques cas de maux de tête et de clignement des paupières qui disparaissent par la suite. Augmentation de la sécrétion lacrymale. Vasodilatation conjonctivale.

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : **Propriétés pharmacodynamiques** : Myotique. Hypotonisant. Parasympathomimétique à action cholinergique directe. La pilocarpine abaisse la pression intraoculaire par augmentation de la facilité d'écoulement de l'humeur aqueuse et par diminution du débit sécrétoire ciliaire. Elle agit sur l'accommodation (action lente) et sur la profondeur de la chambre antérieure de l'œil (augmentation par relâchement de la zonule). La concentration dans la cornée et l'humeur aqueuse est maximale 5 minutes après l'instillation.

Surdosage : Les effets systémiques sont rares et ne sont observés que chez les patients utilisant des doses répétées au cours de glaucome à angle fermé et chez le jeune enfant. Dans ces cas, apparition d'hypersécrétion de la salive, de la sueur et des larmes et de signes bronchopulmonaires et gastro-intestinaux. En cas d'intoxication, utiliser des médicaments anticholinergiques et réhydrater les malades.

DONNEES PHARMACEUTIQUES : **Durée de conservation** : Tout flacon entamé doit être utilisé dans les 15 jours.

PRESENTATION ET NUMERO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE : 332 578-3 (0,5 %) – 332 575-4 (1 %) - 332 576-0 (2 %) : 10 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène). Prix : 2,28 € Remb. Séc. Soc. à 65%. Collect.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : Laboratoires ALCON - 4, rue Henri Sainte-Claire Deville – F-92563 RUEIL-MALMAISON CEDEX.

DATE D'APPROBATION/REVISION : Février 2004.