



1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) DENOMINATION

ISOPTO®-PILOCARPINE 0,5 %, 2 % Collyre en solution

b) COMPOSITION

- ISOPTO®-PILOCARPINE 0,5 %
 - Chlorhydrate de pilocarpine 0,50 g
 - Chlorure de benzalkonium 0,01 g
 - Acide borique, citrate de sodium, chlorure de sodium,
méthylhydroxypropylcellulose, acide citrique monohydraté,
eau purifiéeq.s.p 100 ml
- ISOPTO®-PILOCARPINE 2 %
 - Chlorhydrate de pilocarpine 2,00 g
 - Chlorure de benzalkonium 0,01 g
 - Acide borique, citrate de sodium,
méthylhydroxypropylcellulose, acide chlorhydrique concentré
et/ou hydroxyde de sodium, eau purifiéeq.s.p 100 ml

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Collyre en solution, flacon compte-gouttes de 10 ml.

d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTI-GLAUCOMATEUX ET MYOTIQUES
Parasympathomimétiques

(S : organes sensoriels/oeil).

e) NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires ALCON
4, Rue Henri Sainte-Claire Deville
F-92563 RUEIL-MALMAISON Cedex

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

ALCON CUSI S.A.
E-08320 El Masnou, Barcelone

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

(INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Ce médicament est préconisé dans le glaucome pour diminuer la pression à l'intérieur de l'oeil.

Il peut être utilisé par votre ophtalmologiste dans un but diagnostique.

3. ATTENTION!

a) DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants:

- iridocyclite (inflammation de l'iris) ;
- allergie à l'un des constituants du collyre.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) MISES EN GARDE SPECIALES

- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- Prévenir le médecin en cas de myopie.
- En cas d'intervention chirurgicale, avertir l'anesthésiste de la prise de ce médicament.

c) PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le port de lentilles de contact doit être évité pendant le traitement du fait de la présence de chlorure de benzalkonium.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

En cas de traitement concomitant par un deuxième collyre, il convient d'attendre 15 minutes avant son instillation.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, en particulier si vous êtes déjà traité par un autre collyre.

e) GROSSESSE - ALLAITEMENT

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

L'allaitement est à éviter en cas de traitement par ce médicament.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

f) CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Une modification passagère de la vision après instillation peut gêner la conduite automobile, ou la pratique d'autres activités dangereuses sous faible lumière.

g) LISTE DES EXCIPIENTS AYANT UN EFFET NOTOIRE

Chlorure de benzalkonium.





4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

a) POSOLOGIE

1 seule goutte suffit, à instiller dans l'oeil malade bien ouvert. Le nombre d'instillations est défini par votre médecin.

b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION


Voie locale.

EN INSTILLATION OCULAIRE.

Comme pour tous les collyres, effectuer, dans l'ordre, les opérations suivantes :

1. Se laver soigneusement les mains.
2. Eviter de toucher l'oeil ou les paupières avec l'embout compte-gouttes.
3. Pour instiller ISOPTO®-PILOCARPINE collyre, regarder vers le haut et tirer légèrement la paupière inférieure vers le bas.
4. L'oeil fermé, essuyer proprement l'excédent.
5. Refermer le flacon après utilisation.

Sur l'étiquette du flacon, vous pouvez inscrire la date limite d'utilisation après ouverture : DATE D'OUVERTURE + 15 jours (cette date ne doit pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur).



c) FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

Les horaires des instillations quotidiennes vous seront précisés par votre ophtalmologiste. Respectez la prescription de votre médecin.

d) DUREE DU TRAITEMENT

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'avis de votre médecin.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (EFFETS INDESIRABLES)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS:

- gêne de la vision (due au rétrécissement de l'iris),
- larmolement, rougeur de l'oeil,
- maux de tête, clignement des paupières.

En présence de tout symptôme anormal, consultez immédiatement votre médecin.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6. CONSERVATION

a) NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

b) PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Tout flacon entamé doit être utilisé dans les 15 jours.

7. DATE DE REVISION DE LA NOTICE

OCTOBRE 2001.

ISOPTO®-PILOCARPINE	0,5 %	2 %
MEDICAMENT AUTORISE N°	332 578.3	332 576.0
REMBOURSE SECURITE SOCIALE A 65%		
AGREE COLLECTIVITES		



"Les Laboratoires ALCON participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament, vide ou non".

Alcon®

6-12-920



1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT**a) DENOMINATION****ISOPTO®-PILOCARPINE 1 %**
Collyre en solution**b) COMPOSITION**

Chlorhydrate de pilocarpine 1,00 g
 Chlorure de benzalkonium 0,01 g
 Acide borique, citrate de sodium, chlorure de sodium, méthylhydroxypropyl-
 cellulose, acide chlorhydrique concentré et/ou hydroxyde de sodium, eau
 purifiée q.s.p. 100 ml

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Collyre en solution, flacon compte-gouttes de 10 ml.

d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTI GLAUCOMATEUX ET MYOTIQUES
 Parasympathomimétiques
 (S: organes sensoriels/œil).

e) NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires ALCON
 4, rue Henri Sainte-Claire Deville
 F-92563 RUEIL-MALMAISON Cedex

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

ALCON CUSÍ, S.A.
 E-08320 El Masnou, Barcelone

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT**(INDICATIONS THERAPEUTIQUES)**

Ce médicament est préconisé dans le glaucome pour diminuer la pression à l'intérieur de l'œil.

Il peut être utilisé par votre ophtalmologiste dans un but diagnostique.

3. ATTENTION!**a) DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- iridocyclite (inflammation de l'iris);
- allergie à l'un des constituants du collyre.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) MISES EN GARDE SPECIALES

- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- Prévenir le médecin en cas de myopie.
- En cas d'intervention chirurgicale, avertir l'anesthésiste de la prise de ce médicament.

c) PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le port de lentilles de contact doit être évité pendant le traitement du fait de la présence de chlorure de benzalkonium.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

En cas de traitement concomitant par un deuxième collyre, il convient d'attendre 15 minutes avant son instillation.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, en particulier si vous êtes déjà traité par un autre collyre.

e) GROSSESSE - ALLAITEMENT

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

L'allaitement est à éviter en cas de traitement par ce médicament.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

f) CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Une modification passagère de la vision après instillation peut gêner la conduite automobile, ou la pratique d'autres activités dangereuses sous faible lumière.

g) LISTE DES EXCIPIENTS AYANT UN EFFET NOTOIRE

Chlorure de benzalkonium.

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT**a) POSOLOGIE**

1 seule goutte suffit, à instiller dans l'œil malade bien ouvert. Le nombre d'instillations est défini par votre médecin.

b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION


Voie locale.

EN INSTILLATION OCULAIRE.

Comme pour tous les collyres, effectuer, dans l'ordre, les opérations suivantes :

1. Se laver soigneusement les mains.
2. Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout compte-gouttes.
3. Pour instiller ISOPTO®-PILOCARPINE collyre, regarder vers le haut et tirer légèrement la paupière inférieure vers le bas.
4. L'œil fermé, essuyer proprement l'excédent.
5. Refermer le flacon après utilisation.

Sur l'étiquette du flacon, vous pouvez inscrire la date limite d'utilisation après ouverture: DATE D'OUVERTURE + 15 jours (cette date ne doit pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur).

**c) FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE**

Les horaires des instillations quotidiennes vous seront précisés par votre ophtalmologiste.

Respectez la prescription de votre médecin.

d) DUREE DU TRAITEMENT

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'avis de votre médecin.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS**(EFFETS INDESIRABLES)**

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- gêne de la vision (due au rétrécissement de l'iris),
- larmolement, rougeur de l'œil,
- maux de tête, clignement des paupières.

En présence de tout symptôme anormal, consultez immédiatement votre médecin.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6. CONSERVATION

a) **NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR**

b) **PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION**
Tout flacon entamé doit être utilisé dans les 15 jours.

7. DATE DE REVISION DE LA NOTICE

OCTOBRE 2001

MEDICAMENT AUTORISE N° 332 575.4



"Les Laboratoires ALCON participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament, vide ou non".