

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) DENOMINATION

ALMIDE® 0,1 POUR CENT, collyre.

Lodoxamide trométamol

b) COMPOSITION

Lodoxamide trométamol 0,1780 g
quantité correspondant à lodoxamide 0,1000 g
Chlorure de benzalkonium 0,0070 g
Mannitol, édétate de sodium, méthylhydroxypropylcellulose 2910, citrate de sodium (dihydraté), acide citrique (monohydraté), tyloxapol, acide chlorhydrique (1N) et/ou hydroxyde de sodium (1N), eau purifiée q.s.p. 100 ml

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Collyre. Flacon compte-gouttes de 5 ml.

d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Autres antiallergiques

e) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE/EXPLOITANT

Laboratoires ALCON
4, rue Henri Sainte-Claire Deville
F-92563 RUEIL-MALMAISON Cedex

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Laboratoires ALCON CUSÍ, S.A.
E-08320 EL MASNOU, BARCELONE

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

(INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Ce médicament est préconisé dans le traitement des affections oculaires d'origine allergique.

3. ATTENTION !

a) DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans le cas suivant :

- hypersensibilité au lodoxamide ou à l'un des composants du collyre.

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) MISES EN GARDE SPECIALES

Ne pas injecter, ne pas avaler.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Le port de lentilles de contact souples (hydrophiles) est déconseillé durant l'utilisation de ce collyre.

c) PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas dépasser la posologie prescrite.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre chaque instillation.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, en particulier si vous êtes déjà traité par un autre collyre.

e) GROSSESSE - ALLAITEMENT

Prévenir votre médecin en cas de grossesse ou en cas d'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

f) LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Chlorure de benzalkonium.

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

a) POSOLOGIE

Selon la sévérité des symptômes : 1 à 2 gouttes dans l'œil malade, 2 à 4 fois par jour à intervalles réguliers.

Après amélioration des symptômes, le traitement pourra être prolongé pour maintenir l'amélioration.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.


b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie locale

EN INSTILLATION OCULAIRE

- Se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.
- Eviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières.
- Instiller 1 à 2 gouttes de collyre dans le cul-de-sac conjonctival de l'œil malade en regardant vers le haut, et en tirant légèrement la paupière vers le bas. L'œil fermé, essuyer proprement l'excédent.
- Refermer le flacon après utilisation.

Sur l'étiquette du flacon, vous pouvez inscrire la date limite d'utilisation : DATE D'OUVERTURE + 15 JOURS. Cette date ne doit pas dépasser la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur.



c) FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

Espacer les instillations quotidiennes.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre chaque instillation.

d) DUREE DU TRAITEMENT

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Ne pas prolonger le traitement sans avis médical.

e) CONDUITE A TENIR AU CAS OU L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ETE OMISE

Si vous oubliez une dose, contentez-vous de prendre normalement la dose suivante.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

(EFFETS INDESIRABLES)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Les effets indésirables suivants peuvent se manifester dans votre oeil :

Très fréquents : irritation oculaire, douleur oculaire, gêne oculaire. Ces effets se produisent généralement lors de l'instillation et sont transitoires.

Fréquents : sécheresse oculaire, démangeaison oculaire, formation de croûtes au niveau des paupières, augmentation de la production de larmes, rougeur oculaire, vision floue.

Peu fréquents : œdème des paupières (gonflement des paupières), réactions allergiques locales et trouble de la vision.

Les effets indésirables suivants peuvent également se manifester dans d'autres régions du corps :

Peu fréquents : vertiges, maux de tête, somnolence, nausées, troubles gastriques, éruption, sensation de chaleur.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6. CONSERVATION

a) NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

b) PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Ce médicament doit être conservé verticalement à température ambiante et utilisé dans les 15 jours après l'ouverture du flacon.

7. DATE DE REVISION DE LA NOTICE

JANVIER 2009.

MEDICAMENT AUTORISE N°332 864.6



"Les Laboratoires ALCON participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament, vide ou non".